



DDETSPP  
Mayenne

## BOVINS

● **1<sup>ère</sup> VACHE AVORTÉE** : Protocole obligatoire

Prélèvements :  Tube sec

**Écouvillon** (conservé au LDA 53 pour analyses ultérieures)

Analyses :  Brucellose (EAT) prise en charge par DDETSPP

● **2<sup>ème</sup> VACHE AVORTÉE et les suivantes** (dans les 6 mois) : protocole GTV 53 / GDS 53

*Remboursement par le GDS53 à 80% (Hors frais d'envoi)*

Prélèvements :  Tube sec

**Écouvillon**

Analyses :  Brucellose (EAT) prise en charge par DDETSPP

BVD Ac (selon statut vaccinal)

Fièvre Q Ac

Néosporose Ac

Fièvre Q PCR

→ reprise du sérum en systématique du 1<sup>er</sup> avortement pour BVD, FQ, Néo Sérologie

→ si **FQ PCR Positive**, reprise de l'écouvillon du 1<sup>er</sup> avortement pour FQ PCR

**VACHES CONGÉNÈRES** : 3 vaches non avortées

Appartenant au même lot et présentant des symptômes similaires depuis au moins 3 semaines

Prélèvement :  Tubes secs (3)

Analyses :  BVD Ac

Fièvre Q Ac

Néosporose Ac

## OVINS-CAPRINS

● **Protocole GTV 53 / GDS 53** :

La notification d'un épisode abortif n'est obligatoire chez les petits ruminants qu'à partir de 3 avortements ou plus sur une période de 7 jours maximum

*Remboursement par le GDS53 à 80% (Hors frais d'envoi)*

Prélèvement :  Tube sec

Avorton (à défaut placenta ou organes)

Analyses :  Brucellose (EAT) prise en charge par DDETSPP

Autopsie (en systématique sur avorton)

Bactériologie (*Salmonella* + *Listéria*)

Chlamydieuse PCR

Fièvre Q PCR

Néosporose PCR

Toxoplasmose PCR